Ordre : *Agaricales* Famille : *Psathyrellaceae*

Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire

Nom français : Psathyrelle de De Candolle

Cespiteux ou grégaire, en forêt, lisières, lieux herbeux, etc. Chapeau brun ochracé à beige blanchâtre, voile plus ou moins présent et marge garnie de flocons blancs chez les jeunes exemplaires. Lames blanches puis gris lilacin, brunes à maturité. Stipe blanc. Spores 6,5-7,5 x 4-4,5 µm. Cheilocystides 35-45 µm, pleurocystides absentes.
A comparer avec quelques espèces d'un groupe restant à débrouiller, très ressemblantes et souvent sujettes à caution, par exemple *P. pseudogordonii*, *P. bivelata*, citons également :

- *P. elegans* (peut-être synonyme, mais toujours distingué dans la littérature récente) : port plus imposant, voile plus abondant persistant en mèches fibrilleuses ;
- *P. proxima* : identique, à spores 7-8,5 x 4,5-5, cheilocystides 45-60 µm.

Très fréquente, cette espèce peut se rencontrer surtout entre les mois de mars et de novembre, souvent en grand nombre sur les bords de chemins, autour d'arbres avec débris racinaires ou de bois, etc.

Biblio : littérature courante - GEPR.

Fiche réalisée en février 2024 par Patrice TANCHAUD

cheilos