




Ordre : Pezizales

Famille : Pezizaceae

## ***Plicaria endocarpoides*** (Berkeley) Rifai

Synonyme : *Plicaria leiocarpa*

Sur sol brûlé. Apothécies cupulées puis étalées, jusqu'à 5-10 cm, fauve brunâtre à brun noirâtre. Asques amyloïdes. Spores 9-10 µm, rondes, lisses, avec quelques granulations.

En cas de récolte dans un lieu non incendié, envisager *P. sylviae*, espèce sosie plus petite qui possède des spores identiques, surtout connue à ce jour dans la zone méditerranéenne.

Depuis 2006, entre les mois de novembre et d'avril, nous avons pu observer cet ascomycète sur différents secteurs incendiés, comme à St Sornin, Ste Gemme, Rioux, Soyaux, Montendre, Clérac, Bédénac. Des centaines, voire des milliers d'exemplaires étaient souvent présents, permettant ainsi d'apprécier la variabilité de l'espèce. Il est à noter que *P. trachycarpa* poussait souvent en mélange, exigeant donc un contrôle rigoureux des spores.

A noter ci-dessus à droite une récolte insolite dépourvue de pigments.

Biblio : Boudier icône pl. 304 - Discomycètes de France Grelet p. 94 - Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Funghi e cenosi di aree bruciate, G. Monti et al.

Fiche réalisée en juin 2026 par Patrice TANCHAUD





