



Ordre : Tricholomatales

Famille : Mycenaceae

Mycena arcangeliana Bresadola

Nom français : Mycène olivâtre

Sur débris de bois de feuillus. Chapeau brun olive jaunâtre. Lames blanches à jaunâtre pâle. Stipe subconcolore au chapeau, plus ou moins violacé en bas. Odeur de rave puis d'iode en séchant. Spores 6-9 x 5-6 µm.

Avec une écologie similaire et un chapeau jaune à jaunâtre clair (pouvant rappeler *Atheniella flavoalba*), envisager *M. xantholeuca* (pleurocystides absentes). Attention également à *M. chlorantha* qui pousse dans les milieux sablonneux (parfois en touffe), souvent parmi les débris d'*Ammophila* en milieu dunaire, son chapeau est jaune verdâtre pâle à brun olivâtre, sa microscopie est quasi-similaire mais ses spores sont légèrement supérieures (8-11 x 5-7 µm).

Cette espèce est assez typique et visible à tous moments de l'année à partir du moment où les conditions sont favorables, sur le littoral comme à l'intérieur des terres. Il est principalement aisé de l'observer entre les mois de septembre et de décembre.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich.



cheilos

stipe



cheilos

