




Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Ramsbottomia macracantha (Boud.) Benkert & T. Schumach.

Synonyme : *Lamprospora crechquercultii* var. *macracantha*

Grégaire sur le sol. Apothécies 1-3 mm, non stipitées, jaune citrin à jaune orangé. Spores (18)19-23(25) μm (sans l'ornementation), couvertes de grosses et longues épines pointues de 3-10 μm , larges à la base rappelant des épines de rosier. Asques octosporiques avec crochets à la base. Paraphyses pigmentées de jaune orangé.

A comparer avec :

- *R. crechquercultii* : spores 16-18(20) μm avec des épines plus courtes mesurant 2-3(6) μm ;
- *R. asperior* : spores 16-18,5(19) x 15-17 μm , majoritairement subglobuleuses, épines 1,5-4(6) μm ;
- *R. lamprosporoidea* : taxon controversé qui se distinguerait par la présence de poils colorés sur la face externe.

Cet ascomycète ne semble pas très fréquent, nous l'avons rencontré entre les mois de mai et de décembre dans plusieurs secteurs, par exemple à Cadeuil, Varzay, Villars les bois, Nieul les Saintes...

Biblio : Boudier icône 405 - Discomycètes de France Grelet p. 195 - Nordic Macromycètes vol. 1 p. 112 - Bull. FAMM 36(2) 2009.

