




Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

Octospora axillaris (Nees ex Pers.) Moser

Parmi les mousses : *Phascum cuspidatum*. Apothécies 1-2 mm, orangées. Asques octosporiques. Spores (19)21-26(28) x (9)10-11(11,5) μ m, biguttulées, elliptiques à légèrement fusiformes.

A noter l'existence d'*O. axillaris* var. *tetraspora*, qui possède des asques tétrasporiques, des spores de forme identique légèrement plus grandes (22)26-32(40) x (9)10-12(15) μ m, mais surtout avec trois guttules, deux petites aux extrémités et une plus grosse au centre.

O. musci-muralis var. *neglecta* pousse sur d'autres mousses et ses spores sont plus arrondies aux pôles.

Cet ascomycète est fréquent, notamment entre les mois de décembre et de février, sur vieux murs en pierres et parpaings. Nous ne pouvons pas affirmer que la mousse hôte citée ci-dessus était bien présente à chaque fois, néanmoins les spores typiques ne peuvent guère nous conduire vers un autre taxon. Signalons également que nous avons parfois observé des spores allant jusqu'à 30 μ m.

Biblio : Bull. Société Hist. Nat. du Doubs 1988-1989 84 (clé de détermination du genre *Octospora* et genres voisins par Michel Caillet & Gilbert Moyne) - Nordic macromycètes vol. 1.

