



Ordre : Tulostomatales

Famille : Tulostomataceae

Tulostoma brumale Pers. : Pers.

Nom français : Tulostome des brumes






Dans les milieux aérés, sur différents types de sol. Basidiome constitué d'une tête blanchâtre à brunâtre pâle avec présence d'un ostiole cerné de brun rouillé, et d'un stipe concolore. Spores 3,5-5,5 µm. Capillitium typiquement élargi aux cloisons.

A comparer avec *T. beccarianum* et *T. kotlabae* qui, à nos yeux, paraissent bien délicats à séparer, même avec une microscopie rigoureuse ; un séquençage peut paraître rassurant afin de confirmer les déterminations.

Il s'agit ici du tulostome le plus fréquent dans notre région, il est visible à toutes périodes de l'année, tant à l'intérieur des terres (souvent sur sol calcaire) que sur le littoral.




Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'exemplaire de trois récoltes présentées pages 2, 3 & 4.

Biblio : littérature courante - Gastéromycètes épigés d'Europe, 2ème édit. 2003, édit. FAMM.



Ile de Ré
Déc. 2023

Forêt de La Coubre
Déc. 2023



Ile de Ré
Déc. 2023

