




Ordre : *Leotiales*

Famille : *Sclerotiniaceae*

Moellerodiscus lentus (Berk. & Br.) Dumont

Synonymes : *Helotium phlebophorum*, *H. lentum*

Surtout sur feuilles et bois. Apothécies 2-5 mm, en forme de coupes plus ou moins longuement stipitées. Hyménium beige, jaunâtre à jaune-brun ou brun rougeâtre. Excipulum finement pubescent. Stipe verruqueux, noircissant par la base. Spores 5-10 x 1,5-3 μ m, hyalines, souvent avec une petite guttule à chaque pôle. Asques contenant huit spores bisériées, à sommet J+ et la base avec crochet. Paraphyses cylindriques à contenu jaunâtre. Excipulum ectal de texture globulosa possédant un pigment jaune.

En réalité, plusieurs espèces difficiles à distinguer semblent exister autour de ce binôme, des études sont en cours pour tenter d'éclaircir ce complexe. Nous restons à l'affût de publications à venir...

Nous avons plusieurs récoltes que nous rattachons à ce taxon, toutes réalisées en milieux humides dans nos deux Charentes, avec présence de frênes, peupliers et parfois aulnes. Les ascomycètes étaient sur pétiole de feuilles ou branchettes au sol.

Biblio : DVD H.O. Baral.

