



Ordre : Tricholomatales

Famille : Hygrophoraceae

Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kummer

Nom français : Hygrophore ponceau

En prairies et pelouses, parfois clairières. Chapeau hygrophane, rouge carmin, rouge grenat à rouge sang plus ou moins brunâtre, un peu gras au toucher, décolorant à délavé par le centre. Lames jaunes ou orange. Stipe méchuleux, plus ou moins couvert de fibrilles orangé rougeâtre, creux, avec la base blanche. Chair blanche dans la moelle du stipe, jaunâtre dans le cortex. Odeur nulle. Spores 7,5-11 x 4,5-5,5 µm, parfois étranglées au milieu.

A comparer avec :

- *H. splendidissima* : chapeau rouge vif éclatant, sec à non visqueux ; stipe lisse, sec, creux et comprimé plus ou moins difforme ; chair fragile, rouge dans le chapeau, jaune orangé dans le stipe ; odeur miellée en séchant ;
- *H. coccinea* : chapeau rouge vif éclatant, lubrifié à légèrement visqueux ; stipe généralement lubrifié ; chair ferme, jaune à orangée dans le stipe.

Hygrophore peu fréquent, observé à Soullignonne et en différents points de Charente limousine (photographie à droite, en compagnie de notre ami François Valade). Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire provenant de Charente.

Biblio : littérature courante.