



Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet

Nom français : Tricholome jaunissant

En forêt, surtout sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau peu mamelonné, gris à gris-beige, feutré à fibrillo-méchuleux sur fond pâle, jaunissant en vieillissant. Lames blanchâtres, jaunissant avec l'âge ou à la manipulation. Stipe blanc grisâtre, jaunissant, parfois avec un bourrelet cotonneux blanc. Odeur et saveur farineuses. Spores 5,5-6,5 x 3-4 µm. A noter l'existence de deux aspects de ce tricholome :

- *f. meleagroides* : diffère du type par ses squames piléiques concentriques gris sombre à noir sur fond pâle ;
- *var. atrocinctum* : présence d'un bourrelet cotonneux noirâtre sur le stipe.

A comparer avec deux espèces faisant souvent débat :

- *T. inocybeoides* (syn. *T. alboconicum*) : surtout sous bouleaux et peupliers, chapeau mamelonné et plus pâle, chair peu jaunissante ;
- *T. argyraceum* : chapeau conique à mamelonné couvert d'un voile laineux sur jeunes exemplaires.

L'odeur et la saveur de farine, ainsi que le jaunissement (plus ou moins rapide, pouvant aller de quelques heures à quelques jours), permettent d'identifier ce tricholome. Il est très fréquent dans la région et peut apparaître tous les mois de l'année, sa période de prédilection restant de juin à janvier/février. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage de l'exemplaire de la récolte page 2.

Biblio : littérature courante.



