



Ordre : Gomphales

Famille : Ramariaceae

Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quélet

Nom français : Ramaire droite

Sur bois pourri de feuillus, parfois parmi les feuilles. Rameaux droits, ocre brunâtre, à sommets jaunes puis concolores. Brunît au froissement. Spores 6,5-10 x 3,5-5,2 µm, verruqueuses. Hyphes et basides bouclées.

A comparer avec *R. ochracea*, autre espèce lignicole venant sur bois de feuillus, ses spores sont echinulées et nettement plus petites (4-6 x 2,7-4 µm).

Artomyces pyxidatus présente la même écologie, il vient souvent sur peuplier tremble, mais ses fructifications pâles et le sommet de ses rameaux ne doivent pas prêter à confusion.

La venue sur bois pourrissant de feuillu, ou à proximité, caractérise assez bien cette espèce. Elle est fréquente et fait souvent son apparition après les pluies, parfois dès le mois de juillet, et elle peut encore être observée en décembre.

Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire de la récolte page 2, avec des ramaires pouvant paraître surprenants pour aboutir à *R. stricta*...

Biblio : littérature courante - Die Gattung Ramaria in Deutschland Josef Christan p. 248 - Bull. FMBDS Gannaz et Raillère-Burat (2017).





