



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius delaportei R. Henry

Sous feuillus. Chapeau visqueux, crème orangé à beige roussâtre. Lames gris lilacin à gris argilacé, puis fauve ochracé. Stipe nettement lilacin dans la jeunesse mais rapidement blanchâtre, bulbe ovoïde à submarginé ourlé d'un voile bleu lilas. Chair blanchâtre plus ou moins faiblement ochracée à reflets lilacins. Odeur faible à légèrement terreuse, saveur douce. KOH nul sur cuticule et chair. Spores 9,5-12,5 x 5-7 µm.

A comparer avec :

- *C. fulvoincarnatus* : sous feuillus, saveur amère, KOH rose rougeâtre sur cuticule et chair ;
- *C. arcuatorum* : sous feuillus, saveur amarescente, KOH rose rougeâtre sur chair seulement ;
- *C. pseudoarcuatorum* : sous conifères, bulbe large et marginé, difficile à distinguer et synonyme selon certains auteurs (nom alors prioritaire).

Ce cortinaire, aux allures d'*Hebeloma sinapizans*, peut se rencontrer occasionnellement dans la région. Nous l'avons observé durant les mois d'octobre et de novembre dans les départements de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres.

Biblio : DM n° 73 (1988) - ADC Bidaud et al.







