



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius fulminatus Reumaux

-

Synonyme : *C. alcalinophilus* ss. auct. (binôme controversé)

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, jaune-fauve à orange cuivré, parfois un peu olivâtre, plus ou moins parsemé de petites plaques brunes surtout concentrées vers le centre. Lames jaunes à orangé saumoné, puis brun olivâtre. Stipe jaune pâle, base avec un bulbe marginé. Chair blanchâtre dans le chapeau, jaunâtre dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH acajou sur le chapeau, gris violacé sur la chair. Spores 9,5-11,5 x 6-6,5 µm, amygdaliformes.

Ce cortinaire appartient à une section complexe (*Fulvi*) qui reste à débrouiller et avec des espèces controversées.

A comparer par exemple avec :

- *C. subfulgens* : rare, chapeau jaune d'or puis orangé, lisse ou presque, lames orangées, chair plus jaune surtout dans la base du stipe, spores citriformes ;
- *C. olearioides* : très rare, proche de *C. fulminatus*, chapeau lisse et safrané avec l'âge, lames orange vif (rappelant celles d'*Omphalotus olearius*) ;
- *C. fulgens*, *C. solitarius*, *C. majusculus* : taxons ingrats, parfois controversés, et non retenus par certains auteurs.

Voir également la fiche de *C. quercilicis*.

Le nombre de récoltes présentées ici montre combien ce cortinaire est fréquent dans la région, il est parfois visible dès le mois d'août et plus fréquemment l'automne, aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral. Un séquençage serait néanmoins utile à l'avenir pour tenter d'y voir plus clair, il est possible que nous présentions ici plusieurs espèces sous le même binôme...

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD











