



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius rapaceotomentosus Delaporte & Eyssart.

Sous chênes, hêtres et charmes sur sol calcaire. Chapeau souvent peu visqueux, feutré à fibrilleux, blanchâtre crème puis taché d'ochracé roussâtre. Lames crème grisâtre puis ochracé rouillé. Stipe blanchâtre, parfois gris-bleu au sommet ; bulbe marginé souvent peu développé couvert d'un voile fibrilleux blanc (violet chez la var. *violaceotinctus*, cf. photographie ci-dessus à droite). Chair blanchâtre, avec une teinte gris bleuté au sommet du stipe chez les jeunes exemplaires. Odeur de pâtisserie, saveur douce. KOH gris lilas ou acajou sur la cuticule. Spores 9,5-11,5 x 6-7 µm.

Avec une écologie similaire, mais avec une cuticule nettement visqueuse, à comparer avec *C. caroviolaceus* et *C. rapaceoides* ; avec une odeur puissante de fleur d'oranger, il s'agit de *C. osmophorus*.

Ce cortinaire ne semble pas rare dans la région, dans les forêts calcaires avec majorité de chênes verts, nous le rencontrons chaque automne, souvent durant la première quinzaine de novembre.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR.

