



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer

Synonymes (probables ou possibles) ou non, avis toujours divergents à l'heure où nous écrivons ces lignes : *M. rickenii*, *M. gracilentia*, *M. konradii* (ss. auct.)

Nom français : Lépiote mamelonnée

En prairie et dans les endroits herbeux en forêt claire. Chapeau plus ou moins mamelonné avec des écailles variables, brunes sur fond clair. Lames blanc crème. Stipe beige crème finement chiné, anneau généralement double. Spores 13-19 x 8-10,5 µm.

- Avec un chapeau aux écailles labiles peu nombreuses, des lames rosées et un anneau complexe, voir *M. rhodosperma* (syn. *M. konradii* (ss. auct.)).
- A noter l'existence de *M. mastoidea* var. *affinis*, variété avec un stipe très chiné, différence peu concluante à notre avis pour la séparer de l'espèce type.
- Sur le littoral, existent *M. phaeodisca* et *M. psammophila*, parfois également ingrats à distinguer.

De telles lépiotes poussent chaque automne sur le littoral et à l'intérieur des terres, parfois dès le mois d'août lorsque les conditions sont favorables, et éventuellement assez tard en saison jusqu'en décembre.

Biblio : littérature courante - Funga nordica - GEPR.



