




Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Sarcodon quercinofibulatus M.A. Pérez-de-Gregorio, N. Macau & J. Careó

Sous chênes, hêtres et châtaigniers. Chapeau 15-23 cm, brunâtre ochracé à brun-gris, couvert d'écailles dressées disposées de manière concentrique. Aiguillons crème grisâtre plus ou moins décurrents. Stipe subconcolore au chapeau. Chair blanchâtre à crème, sans teintes bleu-vert à la base. Saveur douce à légèrement amère. KOH gris-vert sur la chair. Spores 6-8 x 5,5-7 µm. Présence de boucles aux cloisons des hyphes.

A comparer avec de nombreuses espèces fort ressemblantes :

- *S. imbricatus* : sous épicéas sur sol calcaire, chapeau plus sombre avec de grosses écailles dressées ;
- *S. squamosus* : chapeau plus sombre, sous pins sur sol acide.

A noter que de nombreuses espèces ont été basculées dans le genre *Hydnellum* (basidiomes plus coriaces, spores plus petites), cf. par exemple fiches *H. illudens* et *H. fagiscabrosum*.

Ce *Sarcodon* a été récemment décrit (2011), nous l'avons rencontré dans plusieurs bois de feuillus en Charente-Maritime et en Charente, il semble néanmoins peu fréquent.

Biblio : Revista Catalana de Micologia, vol. 33: 25-30 (2011) - Mycol Progress (2013) 12:465-474.

