



St Sornin, oct. 2012



St Amant de Graves (16), oct. 2013

Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma neglectum (Lasch : Fr.) Mos.

Synonyme : *Entoloma cancrinum*

Dans les prairies moussues à tendance calcicole. Chapeau 0,5-4 cm, tomenteux, crème carné, non hygrophanes. Lames blanches puis roses, peu serrées, adnées à décurrentes. Stipe pâle. Odeur et saveur fortement farineuses. Spores 9-12,5 x 6-9 µm, cystides absentes, boucles présentes.

A comparer notamment avec *E. cettoi*, *E. undatum*, et surtout *E. pallens*, ce dernier possédant des spores plus petites. A noter néanmoins que, selon une étude récente, *E. neglectum*, *E. cettoi* et *E. cremeoalbum* pourraient être synonymes...

Cet entolome semble assez rare dans la région, à ce jour, nous l'avons observé à plusieurs reprises. A noter deux récoltes sur fumier et crottin.

Biblio : Entoloma M.E. Noordeloos.

Fiche réalisée en avril 2026 par Patrice TANCHAUD



St Sornin, oct. 2012



Deux récoltes à écologie particulière :

- ci-dessus à droite : sur mélange de fumier et paille, octobre 2014 à Massignac (16) ;
- ci-contre : parmi le crottin, juin 2018 à Nieul les Saintes (17).