



Ordre : Tricholomatales

Famille : Marasmiaceae

Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer

Sur ou parmi les débris herbacés. Chapeau 10-30 mm, ochracé orangé à gris ocre, plus sombre au centre, villeux et souvent zoné. Lames blanchâtres. Stipe 1,5-3,5 mm, assez large pour le genre, subconcolore au chapeau, plus sombre dans la moitié inférieure, avec la base parfois bulbeuse. Spores 7,5-9,5 x 4,2-5,5 µm. Cheilocystides subclavées à fusiformes. Poils cuticulaires obtus, devenant jaunâtres dans l'ammoniaque.

A comparer avec :

- *C. tomentosa* (dont les limites restent assez subtiles, seul un ensemble de caractères semble faire la différence, s'il s'agit bien d'une espèce distincte ?) : allure moins robuste, couleurs moins vives, stipe à base non bulbeuse, spores légèrement plus larges, poils cuticulaires plus aigus hyalins dans l'ammoniaque et cheilocystides plus utriformes ;
- *C. pedemontana* : autre sosie (méditerranéen) se distinguant par la présence dans la cuticule de chlamydospores sphéropédunculées longuement pédicellées.

Espèce occasionnellement visible, nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises à la période automnale, par exemple à Soulignonne, La Chapelle des Pots, St Sornin, Bréville...

Biblio : A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe, V. Antonín & M.E. Noordeloos, 2010 - Pilzk. E. Ludwig band 1.





cheilos

poils cutic.

Bréville (16), oct. 2014

