



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula persicina Krombholz - Synonyme probable : *R. roseocrema* - Nom français : Russule couleur de pêche

Sous feuillus. Chapeau brillant à velouté, rouge vif, rosâtre et décolorant en crème, cuticule peu séparable. Lames blanc crème. Stipe blanc, parfois avec du rouge, parfois légèrement jaunissant. Odeur fruitée. Saveur âcre. Gaïac nettement positif sur stipe et lames. Sporée 2c. Spores 7-8,5 x 6,5-7 µm. Présence de dermatocystides non cloisonnées.

Des études sont toujours en cours pour tenter de cerner les espèces gravitant autour, citons *R. rubrata*, *R. occasus*, *R. rubicunda* qui semblent bien être des taxons à part, néanmoins très difficiles à distinguer même à l'aide du microscope.

A comparer également avec :

- *R. luteotacta* : espèce plus jaunissante à sporée blanche ;
- *R. sanguinea* : sous pins, sporée légèrement plus sombre (3a) et surtout dermatocystides cloisonnées ;

Quelques russules peuvent également ressembler, mais avec une chair ayant tendance à grisonner et à sporée plus sombre (3b) : *R. exalbicans*, moins âcre, vient exclusivement sous les bouleaux et *R. rubra* à odeur de miel. D'autres pourraient aussi rappeler cette espèce mais à sporée plus pâle (cf. fiche *R. lepida*).

R. persicina s.l. n'est pas rare, nous l'observons chaque année, l'été ou l'automne, sur différents secteurs, sous charmes, peupliers trembles et chênes.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD

Gaiac



dermato.





Ci-contre, récolte réalisée en juillet 2017 dans les bois de St Germain du Seudre, avec un chapeau rouge uniforme et la chair rose sous la cuticule, pouvant correspondre à *R. persicina* var. *rubrata*, variété placée en synonymie par Sarnari.







