



Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Russula violeipes Quélet

Nom français : Russule à pied violet

En forêt. Chapeau velouté de couleurs variables, allant de rouge-pourpre, violet carminé à jaune verdâtre (*f. citrina*). Lames crème à maturité. Stipe lavé de violacé. Saveur douce. Odeur de topinambour ou d'écrevisse en train de cuire. Phénol brun chocolat. Sporée 2a-2b. Spores 7,5-9 x 6,5-8 µm. Poils de la cuticule à article terminal en pointe reposant sur des articles typiquement globuleux (ce qui est peut-être le meilleur caractère selon Romagnesi).

Vu la variabilité des couleurs du chapeau des espèces de cette Ss. Section *Amoenineae*, deux taxons sont parfois délicats à distinguer, *R. amoenicolor* (phénol brun-pourpre) et *R. amoena* (phénol violet cassis).

Cette russule est visible chaque automne, parfois dès les mois d'été. Il est à noter que notre ami F. Valade a fait séquencer trois russules de ce groupe, une rouge, une verte et une violette (réagissant en pourpre cassis au KOH), toutes sont sorties sous le nom de *R. violeipes*, ce qui laisse songeur sur la fiabilité de la réaction au KOH, et sème le doute nos identifications du passé. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire de la récolte page 2.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





