



Montchaude (16), oct. 2013



Ile d'Aix, déc. 2014

Ordre : Boletales

Famille : Sclerodermataceae

Scleroderma cepa Pers. : Pers.

Synonyme : *S. flavidum*

En forêt, surtout sous *Quercus* ou *Eucalyptus* sur sols siliceux. Fructification irrégulière plus ou moins longuement stipitée. Péricidium assez épais (1-2 mm), brun-jaune à jaune doré, finement écailleux dans la jeunesse, rapidement lisse puis crevassé. Spores 9-13 μ m, ornées de fortes épines pyramidales (jamais réticulées). Boucles absentes dans le péricidium.



A comparer avec :


- *S. areolatum* et *S. verrucosum* : boucles également absentes, épaisseur du péricidium inférieure à 1 mm et surface différente ;
- *S. bovista* : spores réticulées ;
- *S. meridionale* : spores réticulées, espèce du bord de mer de couleur jaune soufre à jaune-brun s'ouvrant en étoile comme chez *S. polyrhizum*, présence d'un pseudostipe remarquablement irrégulier, crevassé et lacuneux, chair blanche (coupe).


Cette espèce, dont la microscopie paraît indispensable pour une détermination fiable, est moyennement fréquente. Nous l'avons récoltée sous feuillus à Montchaude (16), ainsi que sous *Eucalyptus* ou chênes verts en divers points du littoral (Fouras, La Coubre, îles de Ré et d'Aix...).

Biblio : Gastéromycètes épigés d'Europe, 2ème édit. 2003, FAMM.


Fiche réalisée en avril 2026 par Patrice TANCHAUD







Fouras, mars 2015



Ile d'Aix, déc. 2015