




Ordre : *Leotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

Hyaloscypha fuckelii Nannfeldt

Surtout sur feuillus, mais aussi sur conifères ou sur vieux polypores. Apothécies inférieures à 1 mm. Hyménium blanc. Marge poilue. Poils 30-60(90) x 2-6 µm, lisses, pouvant contenir de la résine jaune (non soluble dans le melzer), à parois minces, coniques à lagéniformes, sommet effilé de 0,7-1(1,5) µm de large, base non ou peu septée. Spores 5,5-9,5 x 2-2,5 µm. Asques à sommet amyloïde, pleurorhynques (base avec crochet).

A comparer avec :

- *H. daedaleae* : microscopie plus ou moins similaire, serait lié uniquement au chêne ;
- *H. fuckelii* var. *alniseda* : diffère pas ses asques aporynques (sans crochet à leur base) ;
- *H. aureliella* : fréquent sur pin, sommet des poils atteignant 1,5-2 µm de largeur et contenant une résine jaune soluble dans le melzer.

A ce jour, la seule récolte de cet ascomycète que nous ayons à notre actif, a été réalisée en juillet 2007 à Soulignonne, sur bois de feuillu non déterminé. Les spores observées mesuraient 6-9 x 2-2,5 µm.

Biblio : Nordic macromycetes vol. 1, p. 194 - DVD H.-O. Baral.