



Ordre : Gomphales

Famille : Ramariaceae

Ramaria flaccida (Fr. : Fr.) Rick.

Synonyme : *Phaeoclavulina flaccida* (nouveau nom de genre à adopter)

Généralement sous conifères. Rameaux ocre jaune, pointes plus claires à subconcolores, immuables au toucher. KOH nul à ochracé sur les rameaux. Spores 5,5-8,5 x 2,8-4,2 µm, nettement épineuses. Boucles présentes.

A comparer surtout avec :

- *R. eumorpha* : sous conifères, véritable sosie, réagit en rouge au KOH, spores subtilement plus grandes ;
- *R. ochracea* (sur bois de feuillus) et *R. myceliosa* (sous conifères) : spores nettement plus petites ;
- *R. decurrens* et *R. flaccida* var. *crispula* : autres sosies liés aux feuillus (séquençage presque obligatoire...) ;
- *R. stricta* : sur bois de feuillus, spores seulement verruqueuses, sans épines.

Espèce probablement peu fréquente sur nos secteurs de prospection, la récolte présentée ici a été réalisée en décembre 2014, sous cèdre à Saintes.

Biblio : littérature courante - Die Gattung Ramaria in Deutschland Josef Christian p. 268 - BK2 468 - Bull. FMBDS Gannaz et Raillère-Burat (2017).