



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

Otidea concinna (Pers.) Sacc.

Dans les bois de conifères ou mêlés. Apothécie cupuliforme, non en forme d'oreille, généralement fendue latéralement. Hyménium blanchâtre crème à ochracé. Face externe jaune vif, sans veines ou plis à la base. Spores (10)10,5-12 x (5)5,5-6,5 μm , oblongues. Paraphyses hyalines sans vacuoles.

A comparer avec les espèces du même genre, notamment :

- *O. minor* : face externe avec des veines à la base, spores (10)10,5-12,5(13) x (4,5)5-5,5(6,2) μm , donc d'un quotient moyen (Qm) un peu plus élevé ;
- *O. phlebophora* : paraphyses moniliformes et spores subtilement plus petites ;
- *O. onotica* : en forme d'oreille, hyménium et face externe souvent piquetés de taches rouges, paraphyses avec de nombreuses vacuoles jaunâtres.

A ce jour, nous pensons avoir rencontré cet ascomycète sur deux stations :

- ci-dessus à gauche : Magnac-Lavalette, sous majorité épicéas.
- ci-dessus à droite et page 2 : Nieul les Saintes, sous chênes verts et pins ;

Biblio : BK1 62 - Pézizales de Rhône-Alpes (FMBDS), 1^{ère} partie - Persoonia 35, 2015.

