





Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinopsis gonophylla (Quélet) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus gonophyllus*

Nom français : Coprin à spores subsphériques

Généralement sur places à feu. Chapeau 1-2 cm, globuleux puis ovoïde, recouvert dans la jeunesse d'un voile blanc. Lames noires à maturité. Stipe blanc. Spores 6-8,5 x 5-8 µm, subglobuleuses. Voile constitué d'hyphes diverticulées (Sous-section *Alachuani*).

A comparer avec *C. spilospora* qui pousse sur le sol et parfois en milieux brûlés, son voile est à parois épaisses et ses spores ont une plage plus claire typique. Attention également à deux espèces à spores légèrement ressemblantes, mais appartenant à la Sous-section *Lanatuli* (voile filamenteux) : *C. jonesii* poussant sur places à feu et *C. spelaiphila* venant sur bois.

Espèce peu fréquente, visible à toutes périodes de l'année, rencontrée en différents points de la région, sur places à feu ou autres lieux incendiés.

Biblio : Studies in Coprinus d'Ulje - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 278.

