



Ordre : Tricholomatales

Famille : Dermolomataceae

Dermoloma pseudocuneifolium Herink ex Bon

En pelouse, parfois sur sol riche en forêt. Chapeau 2-5 cm, beige à brun ochracé ou gris bistré, souvent crevassé. Lames blanchâtres à gris brunâtre. Stipe ochracé brunâtre. Odeur et saveur farineuses. Spores 6-8,5 x 3,5-5 µm, amyloïdes.

A comparer avec deux espèces similaires :

- *D. cuneifolium* : stipe blanc blanchâtre, spores plus petites et non amyloïdes ;
- *D. josserandii* var. *phaeopodium* : délicat à distinguer, seules les dimensions sporales légèrement inférieures semblent faire la différence, (4,5)5-6,5(7) x (3)3,5-4,5(5) µm.

Il est à noter néanmoins que le concept de ce binôme soit aujourd'hui devenu ambigu, *D. confusum* pourrait être plus actuel, affaire à suivre à l'avenir...

Espèce probablement peu fréquente, observée en novembre 2012 à St Pierre d'Oléron et décembre 2018 sur l'île d'Aix.

Biblio : DM HS n° 5 p. 141 - Pilzk. E. Ludwig band 1.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD