




Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe queletii Konr. & Maubl.

Sous conifères, souvent sous *Abies*, généralement printanier. Chapeau radialement fibrilleux, ochracé à jaune paille. Lames beiges puis brun ochracé. Stipe blanc à crème pâle, pruneux au sommet, parfois subbulbeux. Spores 8,5-14 x 5,5-7 µm. Cheilocystides métuloïdes, fusiformes à ventrues, parois sans réaction à NH₃. Caulocystides métuloïdes au sommet du stipe.

A noter l'existence d'une espèce ressemblante et récemment décrite poussant également sous conifères, *I. audens*, printanier, assez grand à chapeau terne, ses spores mesurent 8-10,5 x 5-6,5 µm.

L'écologie spécifique de cet inocybe le rend probablement rare dans la région (plus connu en montagne). C'est avec notre collègue Robert Lagarde que nous l'avons découvert en mars 2014, dans des plantations de cèdres à Soyaux et Mansle. La microscopie a montré des cheilocystides métuloïdes de 50-80 µm dont les parois ne réagissaient pas dans l'ammoniaque, des spores de 10-12,5 x 5-6,5 µm et des caulocystides métuloïdes au sommet du stipe, rares au milieu et absentes en bas.

Biblio : Inocybe Stangl - DM n° 108 p. 30.