



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe tjallingiorum Kuyper

Synonyme probable : *I. ovalispora* ss. Kühner & Romagnesi (cf. fiche *I. ovalispora* pour l'autre interprétation de ce taxon au sens strict).

Sous conifères mêlés. Chapeau 2-5 cm, lisse à subtomenteux, parfois un peu écailleux, brun sombre à brun-roux, avec la marge légèrement plus pâle. Lames gris ochracé. Stipe pâle puis brunâtre à reflets plus ou moins orangés à cuivrés, base non bulbeuse. Spores 7,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides jusqu'à 60 µm, fusiformes à légèrement ventrues, à sommet cristallifère. Caulocystides métuloïdes sur tout le stipe.

Ce taxon de la Section *Splendentes*, Ss.-section *Phaeoleucinae*, semble occasionnellement visible dans la région. La récolte présentée page 2 a été réalisée sur la commune des Nouillers, avec un résultat sans appel pour adopter le binôme ici décrit, suite à une analyse ADN. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : DM n° 108 p. 63 - *Inocybe* Stangl - *Funga nordica*.

