



Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci

Synonyme : *Clitocybe gibba* var. *mediterranea*

En forêt, souvent sous chênes verts. Chapeau brun rougeâtre à ochracé roussâtre, marge ondulée. Lames blanches, décurrentes. Stipe concolore au chapeau. Odeur aromatique. KOH sans réaction ou décolorant la cuticule (à tester sur exsiccatum). Spores 4,5-7 x 3-5 µm, larmiformes.

Pour notre région, à comparer surtout avec :

- *I. meridionalis* : chapeau velouté à feutré plus vivement coloré, stipe concolore, spores plus grandes ;
- *I. gibba* : souvent plus pâle, notamment le stipe, cf. cette fiche avec tableau comparatif complet page 2 ;
- *I. costata* : nettement plus grisâtre brunâtre sans teintes orangées ou rousses.

La majorité de nos récoltes à été réalisée sous chênes à feuilles caduques et sous chênes verts, sur le littoral (par exemple Fouras, Meschers) et à l'intérieur des terres (Soubran). La distinction entre *I. mediterranea* et *I. meridionalis* n'est pas aisée, la preuve avec la récolte présentée page 2 provenant de l'île de Ré en compagnie de notre ami François Valade. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : Mille et un champignons P. Roux - GEPR.

Fiche réalisée en mai 2026 par Patrice TANCHAUD



