




Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula cf. albonigra (Krombholz) Fr.

Nom français : Russule blanche et noire

En forêt. Chapeau blanchâtre à brun sale, rapidement taché de noirâtre. Lames blanc ivoire, noircissant avec l'âge ou à la manipulation. Chair blanche, noircissant à la coupe, rougissant faiblement ou pas du tout. Saveur douce typiquement mentholée. Fer orange sur la chair. Sporée 1a. Spores 7-9 x 6-7 µm, très finement ornementées. Cystides contenant de grandes masses d'aspect huileux, pleurocystides sans réaction dans le réactif SBA (sulfobenzaldéhyde).

A comparer avec :

- *R. atramentosa* : non rougissant, lié aux chênes verts dans la région méditerranéenne, lames plus serrées couleur crème à café au lait, pleurocystides noircissant au contact de SBA ;
- *R. albonigra* f. *pseudonigricans* (nettement rougissant, sosie de *R. nigricans* qui a des lames très espacées) et *R. anthracina* var. *insipida* (lames serrées, saveur non mentholée, pleurocystides noircissant au contact de SBA) sont des forme et variété dont l'existence restera à vérifier dans l'avenir.

R. albonigra, taxon de la section *Compactae*, fait maintenant partie d'un complexe d'espèces ne pouvant être séparées qu'après examen microscopique. Il semblerait que sous chênes et chênes verts de la région, avec une réaction verte au sulfate de vert, nous soyons en présence de *R. nigrifacta*, affaire à suivre...

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.