



Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Russula amoena Quélet

Noms français : Russule agréable, Russule veloutée

En forêt, plutôt sur sol acide. Chapeau velouté, violet-mauve plus ou moins ochracé, parfois totalement vert olive à vert bleuâtre (*f. viridis*). Lames crème à maturité, arête plus ou moins bordée de rouge ou de violet. Stipe subconcolore au chapeau à blanchâtre, pruneux. Odeur dite de « topinambour ». Réaction violet cassis au phénol. Sporée 2b-2c. Spores 6,5-8 x 6-7 µm.

A comparer avec les espèces du même groupe :

- *R. violeipes* (plus *f. citrina*) : sporée subtilement plus claire (2a-2b), réaction brun chocolat au phénol ;
- *R. amoenicolor* : réaction brun-pourpre au phénol ;
- *R. aciculocystis* : chapeau rouge vif à rouge framboise, taxon américain controversé pour nos récoltes européennes.

Nous connaissons cette russule sur sols acides, particulièrement en Charente et en Deux-Sèvres (Secondigny). Il est à noter que notre ami F. Valade a fait séquencer trois russules de ce groupe, une rouge, une verte et une violette (réagissant en pourpre cassis au KOH), toutes sont sorties sous le nom de *R. violeipes*, ce qui laisse songeur sur la fiabilité de la réaction au KOH, et sème le doute nos identifications du passé.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





phénol

