




Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Russula parodorata Sarnari


Sous chênes, souvent sous chênes verts ou chênes-lièges. Chapeau 35-70(90) mm, sec, violet lilacin à rose-pourpre, pâissant plus ou moins en ochracé par le centre, voire parfois presque totalement décoloré dès le départ. Lames jaunes à maturité. Stipe blanc, jaunissant. Saveur douce. Odeur faible, légèrement fruitée en vieillissant. Gaïac vif, moyennement rapide, sur stipe et lames. Sporée 4a-4b. Spores 7,5-9 x 6,5-7,5 µm subréticulées. Présence de larges dermatocystides. Espèce de la Ss.-section *Puellerinae*, à comparer avec quelques autres proches, cf. fiche *R. odorata*.

Cette russule, plutôt méditerranéenne, a été récemment décrite (1999) et reste encore assez méconnue, notamment dans la région. Nous l'avons récoltée à deux reprises :

- pages 1 & 2 : sur l'île d'Aix sous chênes verts (plus d'une dizaine d'exemplaires) ;
- page 3 : en forêt de feuillus à Port d'Envaux.

Biblio : Russula Sarnari p. 1190.

Fiche réalisée en décembre 2025 par Patrice TANCHAUD



dermato.

