



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius terpsichores Melot

Synonyme : *C. caesioflavescens*

Sur sol calcaire, sous feuillus ou pins. Chapeau visqueux, bleu-mauve pâle, parsemé de fines fibrilles innées, décolorant en ochracé par le centre. Lames lilacin pâle puis fauve ochracé. Stipe bleuté blanchâtre parcouru de fibrilles colorées par la sporée, bulbe marginé à la base. Odeur de brioche ou de caoutchouc, saveur douce. KOH nul. Spores 8-10 x 5,5-6,5 µm.

Espèce proche de *C. caeruleus*, cf. la fiche de *C. eucaeruleus* pour de plus amples explications sur les difficultés d'identification rencontrées dans ce groupe.

Cortinaire occasionnel, probablement visible presque chaque automne dans de nombreux secteurs de la région. La difficulté réside néanmoins dans l'identification, avec le recul nous pensons que *C. perpallens* est un binôme qui pourrait aussi être adopté pour ces récoltes, ce dernier s'ochraçant par la marge, alors que *C. terpsichores* est rapidement ochracé au centre... Affaire à suivre.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR (remarques sous *C. eucaeruleus*).