



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Cortinaire obtus

Sous conifères, surtout sous pins. Chapeau 1-5 cm, très hygrophane, brun rougeâtre sombre, brun-roux orangé, rapidement déshydraté radialement en ochracé pâle pour finir crème blanchâtre. Lames brun-jaune à brun clair. Stipe ochracé à blanchâtre, fibrilleux, souvent tordu et fusiforme. Chair ochracé jaunâtre. Odeur typique d'iode, renforcée après la cueillette durant la déshydratation, saveur douce. Spores 7-8,5 x 4-5 µm selon GEPR, supérieures selon ADC (problème restant à résoudre). A comparer avec :

- *C. acutus* : « allure de *Galerina* », chapeau ne dépassant pas 15 mm pourvu d'un mamelon pointu ;
- *C. jubarinus* : également sous conifères, moins rapidement hygrophane et inodore ;
- *C. pulverobtus* : bien difficile à cerner, aurait la marge du chapeau et le stipe plus voilés.

Ce cortinaire est fréquent sous les pins de la région, notamment sur sol sablonneux, sur le littoral comme à l'intérieur des terres, nous le rencontrons l'automne et lors d'hivers doux.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.





