



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius sordescentipes Bidaud & coll.

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau hygrophane, brun ochracé terne plus ou moins olivâtre, marge plus pâle avec présence de voile blanchâtre crème. Lames crème puis rouillées. Stipe ochracé brunâtre à brun grisâtre, sommet blanchâtre, plus sombre vers la base. Chair brunâtre, brun-gris noirâtre à la base du stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH violet-noir à la base du stipe. Spores 8-11 x 5,5-7 µm.

Cortinaire de la Section *Hinnulei*, à comparer par exemple avec :

- *C. epipurpus* : chapeau plus vivement teinté de brun châtain à brun-fauve, voile moins abondant, spores plus petites (7,5-9 x 5-6 µm) ;
- *C. safranopes* : chapeau blond ochracé clair, stipe guirlandé d'un voile blanc.

Cette espèce peut paraître d'allure banale pour le genre et être délaissée, elle semble néanmoins assez bien caractérisée, peut-être fréquente (si elle n'est pas confondue ?) certaines années, parfois dès les mois d'été et sinon l'automne.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR.