



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius caroviolaceus P.D. Orton

Synonymes : *C. rapaceus* ss. auct., *C. europaeus*

(Synonyme probable : *C. rapaceus* var. *caesiovergens*)

Sous chênes sur sol calcaire. Chapeau visqueux, blanchâtre à crème puis ochracé, généralement uniformément coloré. Lames crème grisâtre puis ochracé rouillé. Stipe blanchâtre à grisâtre, parfois bleuté au sommet, avec un bulbe marginé développé, couvert de voile fibrilleux. Chair blanchâtre, souvent un peu bleu violacé. Odeur faible, saveur douce. KOH gris lilas ou acajou sur la cuticule. Spores 10-11,5 x 6-7 µm.

A comparer avec quelques espèces à écologie similaire :

- *C. rapaceoides* : peut-être un peu plus massif, voile abondant sur le bord du bulbe, odeur nette de chocolat ;
- *C. caesiostramineus* : (parfois aussi sous conifères) cuticule amère, chapeau pâle, stipe lisse et luisant ;
- *C. amoenolens* (parfois synonymisé à *C. anserinus*) : surtout sous hêtres, viscosité amère, lames bleutées dans la jeunesse, odeur fruitée, spores citriformes.

Voir également *C. rapaceotomentosus* à cuticule peu visqueuse et odeur de pâtisserie.

Ce cortinaire est assez fréquent dans nos forêts de feuillus, notamment sous chênes verts, mais la ressemblance avec les espèces proches doit conduire à la plus grande prudence.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD





