



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius collocandoides Reumaux

Synonymes : *C. purpurascens* var. *largusoides*, *C. collocandus* ss. *auct.*

Plutôt sous chênes. Chapeau visqueux et luisant sur le frais, violet roussâtre à violet purpurin, rapidement brun-fauve à brun ochracé grisâtre. Lames violettes, brun-violet à maturité, se tachant de violet sombre au froissement. Stipe violet, base clavée à submarginée. Chair blanche tachée de violacé. Saveur douce, odeur miellée. TL4 : violet purpurin sur cuticule et chair. Spores 8,5-11 x 5,5-7 µm.

Quelques espèces de la même Section *Subpurpurascens* peuvent paraître bien difficiles à distinguer :

- *C. purpurascens* : spores plus petites, d'une moyenne de 8 x 5 µm
- *C. subpurpurascens* : difficile à distinguer, parfois synonymisé, plutôt sous conifères, chapeau brun-rouge vineux à brun châtain ;
- *C. occidentalis* : sous conifères, chapeau bleu violacé flammé de brun-rouge ;
- *C. lepistoides* (Section *Caerulescentes*) : sous feuillus sur sol calcaire, arête des lames bleue, KOH brun rougeâtre sur la cuticule.

Dans la région, ce cortinaire est assez fréquent l'automne, il ne fait aucun doute que de nouvelles observations seront utiles à l'avenir, en ayant soin de les confronter à la littérature et aux connaissances récentes qui ne manqueront certainement pas d'évoluer.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD





