



Ordre : *Pluteales*

Famille : *Pluteaceae*

Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél.

Synonyme : *P. luteovirens*

Nom français : Plutée jaune verdâtre

Sur bois mort de feuillus. Chapeau jaune citrin à jaune ochracé verdâtre. Lames blanches à jaunâtre pâle, puis roses. Stipe crème. Odeur nulle. Spores 6,5-7 x 5-6 µm. Cuticule constituée d'éléments globuleux.

Avec un chapeau de cette couleur, espèce typique de la Section *Cellulodermatei*. A comparer avec :

- *P. romellii* : en présence d'exemplaires très pigmentés comme ceux présentés en haut de page 3 ;
- *P. leoninus* (cf. cette fiche pour comparatif), *P. variabilicolor*, *P. fenzi* : Section *Hispidodermatei* donc cuticule différente et généralement plus jaunes.

Attention également à *Hydropodia subalpina* (syn. *Hydropus subalpinus*) : véritable sosie vu de dessus quoiqu'un peu plus pâle, normalement sur hêtre, lames blanches (sporée blanche), spores 6-7,5 x 3-3,5 µm cylindriques allantoïdes.

Ce plutée est très fréquent une bonne partie de l'année, notamment dans les milieux frais et humides où il fait rapidement son apparition après les pluies, nous l'observons régulièrement par exemple dans les alentours de Fontcouverte, La Chapelle des Pots, etc.

Biblio : littérature courante.



