



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius insignibulbus Bidaud & Moënné-Loccoz

Sur sol calcaire, sous feuillus ou conifères. Chapeau visqueux, blanchâtre mastic à jaunâtre, un peu flammé de brun. Lames mauve pourpré vif, puis rouillées. Stipe blanchâtre devenant ochracé, violet au sommet, avec une imposante base bulbeuse et marginée. Chair blanche dans le chapeau et le bulbe, lilacine dans le stipe. KOH brun-roux sur la cuticule, rosâtre faible sur la chair, rose vif sur le bulbe. Spores 9-11,5 x 5-6 µm.

Espèce de la Section *Calochroi*, d'allure très élancée, à comparer avec d'autres plus ou moins proches, cf. fiches *C. platypus* (taxon le plus ressemblant) et *C. lilacinovelatus*.

Cortinaire observé à plusieurs reprises sous chênes sur sol calcaire, souvent sous chênes verts, par exemple à Soulignonne, Fouras et au Douhet. A noter que la récolte présentée sur la photographie ci-dessus à gauche a été confirmée suite à étude moléculaire, ce qui prouverait que le chapeau de cette espèce peut être un peu plus coloré que ce qu'il est possible de lire dans la littérature. Voir en page 2 la macrochimie et la microscopie.

Biblio : ADC Bidaud et al.





