



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius pseudophlegmus Henry

Souvent sous chênes. Chapeau sec, finement fibrilleux, très hygrophane, grisâtre lilacin à gris bleuté puis crème ochracé avec l'âge. Lames bleu lilacin puis rouillées. Stipe subconcolore au chapeau avec la base plus ou moins bulbeuse, marginée ou en oignon. Chair blanchâtre, violetée dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-8,5 x 4,5-5 µm.

Dans la même Section *Sericeocybe*, à comparer avec :

- *C. pseudomalachius* : assez ressemblant, également sous feuillus, chapeau non hygrophane, odeur raphanoïde ;
- *C. malachius* : sous conifères, chapeau peu hygrophane, spores plus grandes.

A noter une certaine ressemblance avec *C. veraprilis* (Section *Caerulescentes*), taxon typiquement printanier et méditerranéen poussant sous les chênes verts, souvent semi-hypogé et à odeur désagréable de pomme de terre pourrissante.

Cortinaire probablement peu fréquent, voire assez méconnu. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises, majoritairement sous chênes, sur le littoral notamment à Ronce les Bains, St Augustin et sur l'île de Ré, mais aussi à l'intérieur des terres comme à Ste Gemme et Brigueuil.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.





