



sur fougère



sur brindille



Ordre : Cortinariales

Famille : Strophariaceae

Deconica horizontalis (Bull.) Noordeloos

Synonymes : *Melanotus horizontalis*, *Psilocybe hepatochrous*, *Melanotus textilis*



Sur différents supports, bois, débris herbacés, tissus, etc. Chapeau 5-15 mm, velouté, non strié et non translucide, brun roussâtre à beige. Lames beige grisâtre. Stipe rudimentaire. Spores 6-8(8,5) x (3,5)4-5(5,5) µm, ellipsoïdes à amygdaliformes.

A comparer avec :

- *D. protea* (syn. *Melanotus proteus*) : microscopie plus ou moins similaire, synonyme selon les auteurs, pour d'autres se distinguerait par ses couleurs plus pâles, jaune doré au disque et grisâtre vers la marge, l'ensemble pâlistant en blanchâtre avec l'âge, également il pousserait sur conifères ;
- *D. phillipsii* : sur graminées, *Carex* et *Juncus*, spores légèrement plus petites.


Espèce peu fréquente que nous rencontrons de la fin de l'été à l'automne, et parfois encore en début d'hiver, sur différents supports comme l'indiquent les photographies, mais également sur tissu pourrissant.

Biblio : Mille et un champignons P. Roux - GEPR.



cheilos

Sur Eucalyptus



sur feuilles

