



Ordre : Pezizales

Famille : Helvellaceae

Gyromitra infula (Shaeff. : Fr.) Quél.

Synonyme : *Paragyromitra infula*

Nom français : Gyromitre en turban

Dans les forêts de feuillus et conifères, autour des souches ou parmi les fragments de bois. Chapeau de taille variable, en forme de selle ou de mitre, puis plus ou moins déformé et plissé (attention car pouvant prendre une forme de cervelle et rappelant alors *G. esculenta*) ; face externe brune, intérieur blanchâtre et creux. Stipe blanc à crème jaunâtre, pruneux. Chair cassante, blanchâtre. Odeur et saveur sans particularité. Spores 19-23 x 7-8,5 µm, lisses et biguttulées.

A comparer avec *G. esculenta*, printanier (qui semble avoir été déjà signalé dans notre région) qui présente un chapeau en forme de cervelle (spores 16-21 x 8-11 µm) ; et *G. gigas*, rare espèce montagnarde (spores ornées et appendiculées). Les morilles, quant à elles, possèdent un chapeau alvéolé.

La littérature indique que ce gyromitre pousse surtout l'été et l'automne en montagne. Il est donc plus rare en plaine, et pour ce qui est de notre région, il apparaît plutôt en début d'hiver, d'ailleurs nos observations ont toujours eu lieu à la même saison, en décembre/janvier, notamment dans les forêts de La Coubre et des Combots d'Ansoine (triangle St Augustin, St Palais sur Mer et Les Mathes).

Biblio : littérature courante - BK1 13.







