



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius safranopes Henry

Sous feuillus, surtout sous chênes ou hêtres. Chapeau 3-6 cm, blond ochracé, marge fortement voilée de blanc. Lames espacées, crème puis rouillées. Stipe brunâtre couvert d'un voile blanc formant parfois un anneau fugace, base brunissante. Chair blanchâtre au sommet, safranée dans la moitié inférieure du stipe. Odeur faible, un peu raphanoïde. KOH purpurin sur cuticule et chair du chapeau, violet-noir en bas du stipe (extérieur et chair). Spores 9-11 x 5,5-6,5 µm.

A comparer par exemple avec :

- *C. hinnuleus* : surtout sous conifères montagnards, chapeau plus sombre, brun ocre à brun-fauve, KOH brun sur chair ;
- *C. epipurpureus* : chapeau brun-fauve vif, assez sombre et noircissant ;
- *C. sordescens* : chapeau terne, brun ochracé teinté d'olivâtre.

Cette espèce peut paraître assez reconnaissable, mais sont décrites des variétés et formes parfois déroutantes (*var. bulbosus* : stipe bulbeux et obèse, *var. thermophilus* : grêle à chapeau brun-rouge, *var. laevipes* : robuste, dépourvu du voile, *f. sublaevisporus* : spores presque lisses), auxquelles il faudrait ajouter d'autres taxons de cette Section *Hinnulei* bien difficiles à cerner. Pour cette raison, nous présentons ici plusieurs récoltes, dont certaines font probablement partie d'un taxon proche. De futures études ADN feront probablement avancer ce groupe, encore faudra-t-il de nombreuses observations tant il est ingrat...

Biblio : ADC Bidaud et al.



