



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius epipurpus Chevassut & R. Henry

Surtout sous chênes verts. Chapeau 2,5-6 cm, conique puis conico-convexe, souvent avec un large mamelon central ; revêtement piléique mat, sec, hygrophane, brun châtain à brun-fauve, plus clair en séchant et parfois maculé de taches brun noirâtre avec l'âge ; présence vers la marge d'un léger voile crème assez persistant. Lames plutôt espacées, ocre puis rouillées. Stipe brun-fauve, plus sombre en bas, peu cortiné, avec la base atténuée et radicante. Chair pâle au sommet, brun-roux dans la moitié inférieure du stipe. Odeur un peu terreuse, saveur douce. KOH vineux sur la cuticule et la chair du chapeau, violet-noir en bas du stipe (extérieur et chair). Spores 7,5-9(10) x 5-6(6,5) μm , fortement verruqueuses. A comparer par exemple avec :

- *C. sordescitipes* : chapeau moins vivement coloré avec un voile plus important, spores 8-11 x 5,5-7 μm ;
- *C. hinnuleoradicatus* : surtout sous chênes-lièges, plus charnu, couleurs plus ternes.

Ce cortinaire appartient à l'ingrate Section des *Hinnulei* où les récoltes ne se ressemblent jamais, mais sans réellement savoir s'il s'agit d'espèces différentes. L'automne, il semble néanmoins assez fréquent dans différents secteurs du littoral et à l'intérieur des terres, toujours sous chênes verts ou chênes à feuilles caduques. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage des récoltes présentées page 3, toutes réalisées en différents points de la forêt de La Coubre.

Biblio : DM n° 8, fasc. 32, p. 70-72 - Bull. FAMM n° 20, 2001.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD









