



Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo

Synonyme : *Boletus lupinus*

Nom français : Bolet des loups

En forêt à tendance calcicole. Chapeau rose, mastic rosâtre, rouge-rose, parfois totalement jaune. Pores jaunes, orangés ou rouge vif. Stipe jaune, parfois orangé ou taché de brun rougeâtre, souvent sans réseau ou alors parfois très court au sommet. Chair jaune plus ou moins bleuissante. Odeur de scléroderme. Spores 12-15 x 5-6 µm.

Les couleurs du chapeau et des pores de ce bolet sont parfois assez déroutantes, elles peuvent être très variables d'un mycélium à un autre.

A comparer avec *R. dupainii* qui présente un chapeau rouge vif, et *R. pulchrotinctus* lorsqu'il est rosâtre (espèce plutôt méditerranéenne avec des pores jaunes dans la jeunesse et un réseau concolore sur le stipe).

Ce bolet est fréquent, notamment certaines années où les conditions sont favorables, il pousse surtout l'été, puis en début d'automne. A noter que nous avons souvent rencontré des exemplaires parasités et donc totalement déformés (cf. dernière page).

Biblio : littérature courante.







