



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Rhodocybe parilis (Fr.) Singer

Au sol sous feuillus ou conifères. Chapeau 10-25(40) mm, légèrement tomenteux, hygrophanes, couverts d'une pruine blanche, brun grisâtre taché d'ochracé. Lames grisâtres, rosées à maturité, légèrement décurrentes. Stipe subconcolore au chapeau. Chair blanchâtre. Odeur et saveur sans particularité. Spores 4,5-6,5 x 3,5-4,5 μ m légèrement anguleuses. Cystides et boucles absentes.

A comparer avec :

- *R. brunnea* : chapeau plus brun couvert d'une pruine blanche, spores un peu plus grandes, présence de cystides fusiformes à lagéniformes ;
- *Clitocella nigrescens* (syn. *R. cupressicola*): souvent sur le littoral, nettement plus robuste (chapeau jusqu'à 15 cm), odeur légèrement farineuse ou d'huître fraîche, spores 6,5-9,5 x 5,5-7,5 μ m.

Notre récolte a été réalisée en octobre 2019, en milieu acide le long d'une haie de thuyas sur la commune de Brigueuil. Les chapeaux atteignaient 12 mm au plus, la chair ne présentait ni odeur ni saveur remarquable, les spores contrôlées mesuraient 4,5-5,8 x 3,5-4,3 μ m. Sans certitude à 100% pour adopter le taxon ici décrit, il s'agit néanmoins de celui qui se rapproche le plus de nos spécimens avec la littérature à notre disposition. Il est évident qu'à une époque où l'analyse ADN s'est totalement démocratisée, le recours à cette science deviendrait indispensable si nous observions à nouveau ces champignons sur la station.

Biblio : Micol. e Veget. Medit., 17 (2) : 95-114, 2002 - Pilzk. 1, E. Ludwig - Funga nordica.