



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius cinnamomeus (L. : Fr.) Gray

Nom français : Cortinaire à lames cannelle

Sous épicéas, pins ou bouleaux. Chapeau feutré, brun jaune olivacé à brun rouge orangé. Lames orange vif dans la jeunesse. Stipe jaune olivacé pâle à brun jaunâtre. Chair jaune verdâtre, odeur et saveur sans particularité. Spores 6-8,5 x 4-5 µm.

Pour les espèces ressemblantes, voir les fiches de *C. croceus* (écologie similaire), *C. cinnamomeoluteus* et *C. uliginosus* (écologie différente).

A noter l'existence de :

- *C. pratensis* : plus héliophile, parmi les *Carex* en milieux frais à humides, stipe ornée de fibrilles orangées, spores 7-10 x 4,5-6 µm (donc plus grandes) ;
- *C. sommerfeltii* : sous épicéas, chapeau souvent zoné, couleurs plus ternes et uniformes (chapeau, lames et stipe).

Ce cortinaire semble peu fréquent dans la région. Les espèces de ce groupe sont parfois délicates à déterminer, par exemple, dans le cas de notre récolte à La Pointe Espagnole (ci-dessus à droite), nous aurions pu être tenté de retenir *C. pratensis*, mais les dimensions sporales nettement trop petites nous en ont dissuadé.

Biblio : littérature courante - Marchand tome 7 - Flora photographica - GEPR.

