



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius citrinus P.D. Orton

Synonyme : *C. pseudosulphureus*

Sous hêtres. Chapeau 4-7 cm, jaune-vert, brunissant à noircissant par le centre avec l'âge. Lames jaune olive, rouillées à maturité. Stipe subconcolore au chapeau avec un bulbe marginé. Mycélium jaune. Chair jaune-verdâtre. KOH olivacé sur cuticule (souvent faible) et chair. Spores 8,5-10 x 5-5,5 µm.

A comparer surtout avec :

- *C. splendens* : chapeau non noircissant, chair jaune d'or très vif, spores plus grandes ;
- *C. xanthochlorus* : sous chênes et charmes, plus robuste, chair blanche dans le chapeau, spores plus grandes.

A noter l'existence de *C. intermedius* et *C. citrinovirens*, qui pourraient n'être que des synonymes de *C. splendens*.

Ce cortinaire semble peu fréquent, nous l'avons rencontré en octobre 2019 en forêt de La Braconne, lieu où il a déjà été observé par nos prédécesseurs. Les spores contrôlées mesuraient 9-10 x 5-5,5 µm.

Biblio : ADC Bidaud et al. - Flora photographica - GEPR (remarques sous *C. humolens*).