



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactarius acerrimus Britzlemayr

Noms français : Lactaire très âcre, Lactaire à lames interveinées

Sous feuillus. Chapeau souvent irrégulier, plus ou moins zoné, crème orangé à ochracé rosâtre. Lames fourchues anastomosées ou crispées près du stipe, crème rosâtre. Stipe blanc crème. Lait très âcre. Spores 9,5-14 x 8-11,5 µm, basides bisporiques.

A comparer avec :

- *L. illyricus* : surtout sous hêtres sur sol non ou peu calcaire, chapeau non ou à peine zoné, lames également interveinées ou crispées vers le stipe ;
- *L. evosmus* (chapeau plus pâle) et *L. zonarius* : basides tétrasporiques ;
- *L. mediterraneensis* (dont nous n'avons jamais entendu parler dans la région) : chapeau avec scrobicules (plus denses vers la marge) en cercles concentriques, lames moins roses, peu ou non anastomosées, chair et lait jaunissant lentement finissant crème rosâtre, basides tétrasporiques.

Espèce assez fréquente, visible chaque année à la période automnale, mais également l'été lorsque les conditions sont favorables, parfois même dès le mois de mai.

Biblio : littérature courante.

