



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Lepista sordida*** (Fr. : Fr.) Singer

Nom français : Lépiste sordide

En forêt, dans les parcs ou les prés, en bordures de chemins. Chapeau hygrophane de couleurs très variables, violet, lilacin, brunâtre violeté ou totalement brun, parfois très mamelonné. Lames blanchâtres à lilas, blanches sur exemplaires dépourvus de violet. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 5,5-7 x 3,5-4,5 µm. Il est possible de trouver différentes variétés dans la littérature (*var. aianthina*, *var. umbonata*, *var. lilacea*, *var. obscura*, *var. calathus*), mais il nous paraît raisonnable de placer nos récoltes sous le même taxon décrit ici, sans tenir compte de ces variétés, car il devient sinon impossible de classer de nombreuses récoltes intermédiaires.

A comparer avec *Lepista nuda*, espèce plus charnue et plus massive poussant en forêt tardivement en saison.

Ce lépiste est très fréquent, nous le rencontrons à partir d'octobre, puis fréquemment entre novembre et janvier/mars, mais il est occasionnellement visible les autres mois en fonction des conditions météorologiques.

Biblio : littérature courante.





