




Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Thelephoraceae*

Tomentella cf. stuposa (Link) Stalpers

Synonyme : *T. ruttneri*

Sur bois. Fructification résupinée, aranéeuse, lisse, brune à brun rosé pourpré. Spores 7-9(10) μm , brunâtres, non amyloïdes, aux contours réguliers, pourvues de longues épines pouvant atteindre 3 μm . Hyphes brunes avec boucles aux cloisons. Cystides absentes. Hyménium non bleuissant dans une solution de KOH. Hyphes du subiculum non incrustées.

A comparer par exemple avec :

- *T. lapida* : hyphes du subiculum incrustées, hyménium bleuissant au contact de KOH ;
- *T. bryophila* : apicule des spores fortement amyloïde.

Cette récolte a été réalisée en septembre 2024, sur feuillu sur la commune de Ste Gemme. Aboutir à *T. stuposa* ne paraît pas ridicule, mais cette espèce fait partie d'un groupe restant à débrouiller ; raison pour laquelle une étude ADN a été réalisée, mais sans pouvoir réellement conclure, nous émettons donc quelques réserves pour adopter ce binôme. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage.

Biblio : Guida alla determinazione dei funghi, vol. 2, Jülich p. 245 - Bull. AMO n° 33, 2021.